



Catálogo de Padres

Dohne Merino

Catálogo N° 9

Junio 2026

Convenio INTA – AACM



ASOCIACION ARGENTINA
CRIADORES DE MERINO
Miembro de la World Federation
of Merino Breeders

Catálogo de Padres Dohne Merino 2026

Autoridades

Presidente Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA)

Ing. Agr. Nicolas Bronzovich

Presidente Asociación Argentina Criadores de
Merino (AACM)

Ing. Guillermo Paz

Responsables

Comisión Técnica INTA-AACM

Dr. Joaquín Mueller

Ing. Prod. Agrop. Carlos Epper

Comisión Técnica Provino

Dr. Mauricio Alvarez

Dr. Alejandro Vozzi

Dr. Daniel Maizon

Lic. Gen. Nicolás Giovannini

Comisión Técnica Laboratorios de Lana

Ing. Zoot. Diego Sacchero

Ing. Ernesto González

Ing. Agr. Néstor Franz

Ing. Qco. Sebastián Polacco

Antecedentes

En 2008 la Asociación Argentina Criadores de Merino (AACM) reconoce al Dohne Merino como una variedad de Merino en Argentina incorporándolo a los registros genealógicos de dicha Asociación. En 2010, en la sede de la Asociación Argentina Criadores de Merino, técnicos y autoridades de dicha Asociación, Criadores y técnicos del INTA establecieron el Programa de Mejora Genética para la raza en Argentina. Dentro de algunas acciones, la AACM en conjunto con el INTA llevaron a cabo diversas capacitaciones para habilitar inspectores para la raza para dar fuerza al programa de mejora genética que se estaba iniciando. Desde 2011 las cabañas comenzaron a recibir evaluaciones PROVINO AVANZADO intracabaña y desde 2017 se publica la primer versión del PROVINO AVANZADO POBLACIONAL donde se analizaron en conjunto informaciones fenotípicas y genealógicas provenientes de 12 cabañas Dohne Merino distribuidas en las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. **En este Catálogo se presenta por primera vez en Argentina para ovinos la DEPs (Diferencias Esperadas en la Progenie) para evaluar eficiencia de alimentación denomina Consumo Residual, un hito en los programas de mejora genética de Argentina que buscan identificar reproductores que transmitan eficiencia de alimentación a sus progenies con el impacto positivo esperado en los diferentes ambientes de producción donde se cría la raza.**

Introducción

Presentamos en este Catálogo el mérito genético de padres Dohne Merino evaluados utilizando toda la información disponible a la fecha. Se trata de sus propios registros de producción, la producción de su progenie y la producción de otros parientes. Para ello se considera el grado de parentesco entre el animal y esos parientes utilizando la información genealógica disponible en la AACM. En la evaluación se incluyen padres propios de las cabañas como también padres incorporados mediante semen importados o embriones congelados

Planteles evaluados

Tabla 1: Planteles y centrales de prueba que aportan información a la evaluación poblacional.

Plantel	Ubicación	Contacto	Email
CEAT Esquel	Chubut	Martín Villa	villa.martin@inta.gob.ar
CE Potrok Aike	Santa Cruz	Francisco Milicevic	milicevic.francisco@inta.gob.ar
CE Río Mayo	Chubut	Alejandro Vozzi	vozzi.alejandro@inta.gob.ar
CE Viedma	Río Negro	Mauricio Alvarez	alvarez.juan@inta.gob.ar
Coy Aike	Santa Cruz	Rodrigo García Patella	rodrigo@coyaike.com
El Raully	Buenos Aires	Gastón Vega	gastonevega@hotmail.com
Ganadera Victoria	Santa Cruz	Mauricio Zampedri	mauriciozampedri@yahoo.com.ar
La Agropecuaria	Buenos Aires	Antonio Cassataro	tcassataro@gmail.com
La Agropecuaria	Buenos Aires	Carlos Yunis	carlos_yunis@hotmail.com
Laguna Colorada	Santa Cruz	Gregory Aldridge	gregoryaldridge58@gmail.com
Las Vegas	Santa Cruz	Santiago Sama	sama.jim@gmail.com
Los Flamencos	Tierra del Fuego	Ivon Roberts	ivon_cac@hotmail
Rincón de los Morros	Santa Cruz	Diego Bernard	bernaddiego@hotmail.com.ar

Mediciones

Los registros de producción habituales en borregas y borregos son el peso de vellón, el peso corporal al destete y a la esquila, los resultados del análisis de una muestra de vellón que incluyen el rinde al lavado y el consiguiente peso de vellón limpio, el promedio del diámetro de fibras, su coeficiente de variación y el factor de confort, la profundidad del ojo de bife y el espesor de grasa dorsal, estos dos últimas mediciones tomadas por ecografías. En algunos casos se registran también datos de la segunda esquila de machos y hembras. Toda la información es usada en las evaluaciones genéticas.

DEPs

El mérito genético de los padres para cada característica es presentado como DEP, Diferencia Esperada en la Progenie. Como dice la expresión, la DEP para una característica como el peso de vellón representa la diferencia en peso de vellón que se espera en la progenie de ese padre respecto a la de otro padre promedio nacido en el año 2005 (año tomado como referencia, ver más abajo). Para ello se asume que esa progenie nació del apareamiento del padre con una madre promedio del año de referencia. Por ejemplo un padre con DEP para peso de vellón de 0,1 kg, tendrá progenie con 100 g más de lana que un padre promedio nacido en el año 2005, si ambos fueran apareados con ovejas similares. Del mismo modo un padre con DEP para diámetro de fibra de -0,4 mic tendrá progenie con lana 1 mic más fina que un padre con DEP para diámetro de fibra de 0,6 mic.

Factores considerados

Para predecir las DEPs, Provino utiliza procedimientos BLUP similares a los usados globalmente en la evaluación genética de animales. Estos procedimientos permiten aislar factores no genéticos de los estrictamente heredables. Un ejemplo puede ilustrar este procedimiento de aislación. Supongamos dos animales cuyos pesos de vellón se diferencian en 1 kg. Los factores que pueden explicar al menos parte de esa diferencia son: la cabaña de nacimiento, el año, el sexo, el tratamiento de alimentación, la edad de la madre, el tipo de nacimiento y la edad a la esquila. BLUP corrige esa diferencia en peso de vellón por todos esos factores, dejando solo la diferencia de pesos de vellón que se hereda.

Herencia y correlaciones

Para estimar las DEPs, BLUP considera el nivel de heredabilidad de cada característica y también considera las correlaciones que hay entre características. Así por ejemplo un padre igual a otro en producción de lana pero con menor diámetro de fibras, tendrá DEP para peso de vellón algo menor porque su finura indica tendencia a tener menos lana. Por el mismo motivo también BLUP permite estimar DEPs para caracteres no medidos.

Índices de selección

Cada padre evaluado tendrá DEPs para varias características y el criador interesado en mejorar alguna en particular podrá elegir entre los padres que mejor DEP tengan para esa característica. Muchas veces interesan padres con una combinación de características positivas. Para eso se calculan índices de selección como la sumatoria de las DEPs ponderadas por su importancia económica. En otras palabras padres con mayor índice tendrán progenie que en la suma de sus diferencias genéticas tienen mayor valor económico. Las ponderaciones económicas pueden variar considerablemente, pero su peso relativo entre características suele variar poco. Anualmente se discuten esas ponderaciones y de acuerdo a las demandas más comunes se calculan y presentan dos índices para la raza Dohne Merino. Un índice, el “i2”, que prioriza animales de alto peso de vellón y peso corporal manteniendo la finura actual, y otro índice, el “i1”, que pone énfasis en animales de lana más fina. En la Figura 1 se ilustra el énfasis, en términos económicos, que cada índice pone en peso corporal (PCD+PC1+PCA), peso de vellón limpio (PVL) y diámetro de fibras (PDF).




Figura 1: Contribución de cada carácter usado en el índice de selección a la ganancia económica

Los índices apuntan a varias características al mismo tiempo por ello no logran el máximo mejoramiento posible, o potencial, en una característica en particular si solamente se seleccionaría por ella. En la Figura 2 se ilustra la proporción del mejoramiento genético potencial que logran en cada característica los dos índices.




Figura 2: Proporción del mejoramiento potencial que alcanza cada carácter del índice. Por ejemplo 94% del mejoramiento potencial que se obtendría seleccionando solamente por peso de vellón limpio (PVL).

Exactitudes

Las DEPs, y en consecuencia también los índices, se predicen con diferentes exactitudes según la cantidad y calidad de información disponible. Así un padre con datos de 5 hijos tiene DEPs con una exactitud baja y un padre con 25 hijos tiene DEPs con exactitud alta. Un 100% de exactitud equivale a información disponible de muchos (infinitos) hijos. Exactitudes mayores a 80% se consideran altas, exactitudes menores a 60% bajas. Cada DEP tiene su exactitud. En este catálogo se presenta una exactitud promedio de las principales DEP (peso corporal, peso de vellón y diámetro de fibras). Provino calcula las exactitudes usando toda la información disponible y típicamente en la medida que aumenta la información de un plantel aumenta la exactitud de sus DEPs.

Año de referencia

En este catálogo el año de referencia es el año 2005. Esto significa que las DEPs promedio de los animales nacidos en el año 2005 se ajustan = 0,0 para todos los caracteres. Del mismo modo los índices se estandarizan con promedio = 100 y desvío estándar = 10 para el año de referencia. Cabe señalar que los ajustes y la estandarización permiten una mejor interpretación de las DEPs e índices pero no modifican el ordenamiento y diferencias relativas entre los padres. Los promedios de producción en el año de referencia se visualiza en Tabla 2.

Tabla 2: Valores fenotípicos en el año de referencia.

Abreviación	Unidad	Descripción	Promedio año referencia
PCD	kg	Peso corporal al destete	29,4
PC1	kg	Peso corporal a la primera esquila	45,2
PVL1	kg	Peso de vellón limpio	1,9
PDF1	mic	Promedio diámetro de fibras	17,5
CVF1	mic	CV del promedio diámetro de fibras	19,9
POB	mm	Profundidad del Ojo de Bife	24,8
EGD	mm	Espesor de Grasa Dorsal	3,7
CR	Ms/día	Consumo Residual	0,02

Consanguinidad

La consanguinidad de un padre mide la proporción de genes que provienen de un antecesor común. Por ejemplo un animal nacido de un padre que a su vez fue padre de su madre (apareamiento padre-hija) tiene una consanguinidad del 25%, porque la mitad de los genes de su madre también vienen de su padre. Un alto nivel de consanguinidad alcanzado en pocas generaciones suele provocar taras o depresión de producción, en particular en caracteres reproductivos. En este catálogo se presentan los niveles de consanguinidad estimados con la genealogía disponible.

Criterio de publicación:

Se presentan resultados para padres con progenie evaluada en las últimas 5 camadas, con un mínimo de 10 hijos/as y con al menos 60% de exactitud promedio de las DEPs principales.

Progreso genético:

El catálogo presenta en forma gráfica el progreso genético observado en la población evaluada. Para ello se grafican los valores de cría ($VC = DEPs \times 2$) promedio de las camadas nacidas desde el año 2005. Se puede observar que para el año 2005 las DEPs son = 0,0 y los índices son = 100, ya que se trata del año de referencia. Las Figuras 1, 2 y 3 indican el mérito genético de los animales nacidos en cada año independiente de los efectos ambientales (climáticos o de manejo).

Abreviaciones

Tabla 3: Abreviaciones usadas en el catálogo.

Abreviación	Unidad	Descripción
dep		Diferencia esperada en la progenie en unidad del carácter
vc		Valor de cría (= DEP x 2)
NCD		Número de corderos destetados
PCD	kg	Peso corporal al destete
PC1	kg	Peso corporal a la primera esquila (borrego)
PVL1	kg	Peso de vellón limpio primer esquila
PDF1	mic	Promedio diámetro de fibras primer esquila
ind10		Índice de selección “Afinador”
Ind02		Índice de selección “Lanero”
POB	mm	Profundidad Ojo de Bife, a la primer esquila
EGD	mm	Espesor grasa dorsal, a la primer esquila
an		Año de nacimiento
exa	%	Exactitud promedio
NT		Número total de hijos con datos de PDF1
NC		Número de campos con hijos evaluados

Progreso genético observado

Figura 3: Progreso genético en peso corporal al destete (PCD) y peso corporal a la primer esquila (PC1).




Figura 4: Progreso genético en peso de vellón limpio (PVL1) y promedio de diámetro de fibras (PDF1).




Figura 5: Progreso genético en promedio de área de ojo de bife (POB1) y el espesor de la grasa dorsal EGD1).





Figura 6: Progreso genético en el índice de selección “Afinador” (ind10) y en el índice de selección “Lanero” (ind02).



En las siguientes Tablas se presentan los mejores 10 padres en diferentes características y el listado completo de padres evaluados a la fecha.

Tabla 4: Mejores 10 padres por orden de DEP peso corporal al destete.

nombre	Diferencia Esperada en la Progenie						ind10	ind02	exa	NT	NC	con
	PCD	PC1	PVL1	PDF1	POB1	EGD1						
CALGA DOHNE 146954	3,36	3,59	0,22	-0,16	1,44	0,34	134	116	43	4	0	85
INTA RM 1981	3,20	4,09	0,26	0,48	1,86	0,30	118	89	10	1	2	61
FAR VALLEY 140055	3,12	3,60	0,03	-0,17	0,25	0,21	121	113	38	2	3	85
FAR VALLEY 22-6785	3,07	2,87	0,11	-0,01	-0,03	0,00	120	107	40	1	0	41
COY AIKE 152	2,80	3,19	0,19	0,35	1,01	0,28	114	93	31	2	25	89
INTA RM 1307	2,76	2,78	0,16	0,25	1,83	0,30	115	96	21	1	0	80
RINCON MORROS 91	2,75	2,50	0,11	0,43	0,62	0,13	106	88	65	1	1	83
ROSEVILLE PARK 140464	2,73	2,72	0,14	-0,12	0,31	-0,03	124	112	88	4	3	89
INTA RM 1177	2,55	2,49	0,15	0,27	0,70	0,24	112	95	11	1	2	77
RINCON MORROS 61	2,48	2,10	0,10	0,42	0,80	0,43	104	87	61	2	3	88

Tabla 5: Mejores 10 padres por orden de DEP peso corporal a 1ª esquila.

nombre	Diferencia Esperada en la Progenie						ind10	ind02	exa	NT	NC	con
	PCD	PC1	PVL1	PDF1	POB1	EGD1						
INTA RM 1981	3,20	4,09	0,26	0,48	1,86	0,30	118	89	10	1	2	61
LOS FLAMENCOS 571	1,78	3,83	0,11	0,06	1,32	0,22	113	102	45	1	0	75
FAR VALLEY 140055	3,12	3,60	0,03	-0,17	0,25	0,21	121	113	38	2	3	85
CALGA DOHNE 146954	3,36	3,59	0,22	-0,16	1,44	0,34	134	116	43	4	0	85
COY AIKE 152	2,80	3,19	0,19	0,35	1,01	0,28	114	93	31	2	25	89
LOS FLAMENCOS 791	0,46	3,16	0,14	0,21	1,65	0,27	104	95	46	1	0	70
HAMILTON RUN 150347	1,73	3,00	0,10	-0,22	0,26	-0,24	120	114	47	1	0	84
INTA RM 903	1,80	2,98	0,06	-0,09	0,23	0,26	113	108	34	2	6	84
FAR VALLEY 22-6785	3,07	2,87	0,11	-0,01	-0,03	0,00	120	107	40	1	0	41
INTA RM 1307	2,76	2,78	0,16	0,25	1,83	0,30	115	96	21	1	0	80

Tabla 6: Mejores 10 padres por orden de DEP peso de vellón limpio a 1º esquila.

nombre	Diferencia Esperada en la Progenie						ind10	ind02	exa	NT	NC	con
	PCD	PC1	PVL1	PDF1	POB1	EGD1						
INTA RM 1981	3,20	4,09	0,26	0,48	1,86	0,30	118	89	10	1	2	61
INTA RM 1993	1,41	2,52	0,23	-0,01	0,70	0,19	120	107	25	1	2	65
CALGA DOHNE 146954	3,36	3,59	0,22	-0,16	1,44	0,34	134	116	43	4	0	85
COY AIKE 292	1,59	2,37	0,20	0,26	1,74	0,49	111	95	78	2	3	78
COY AIKE 152	2,80	3,19	0,19	0,35	1,01	0,28	114	93	31	2	25	89
COY AIKE 180	1,19	2,28	0,19	0,40	1,63	0,51	105	88	181	2	1	87
INTA RM 1833	1,39	1,48	0,19	0,55	0,38	0,10	101	82	10	1	3	72
ROSEVILLE PARK 140055	2,04	1,91	0,19	-0,50	1,13	0,17	135	128	144	4	0	88
LOS FLAMENCOS 295	0,40	1,90	0,19	0,08	0,76	0,19	110	101	15	1	5	79
HAMILTON RUN 150409	1,26	1,17	0,18	-0,28	0,26	0,05	123	117	51	1	8	82

Tabla 7: Mejores 10 padres por orden diámetro de fibra (ordenados por los más afinadores).

nombre	Diferencia Esperada en la Progenie						ind10	ind02	exa	NT	NC	con
	PCD	PC1	PVL1	PDF1	POB1	EGD1						
INTA RM 1833	1,39	1,48	0,19	0,55	0,38	0,10	101	82	10	1	3	72
INTA RM 1981	3,20	4,09	0,26	0,48	1,86	0,30	118	89	10	1	2	61
RINCON MORROS 91	2,75	2,50	0,11	0,43	0,62	0,13	106	88	65	1	1	83
RINCON MORROS 61	2,48	2,10	0,10	0,42	0,80	0,43	104	87	61	2	3	88
COY AIKE 180	1,19	2,28	0,19	0,40	1,63	0,51	105	88	181	2	1	87
COY AIKE 152	2,80	3,19	0,19	0,35	1,01	0,28	114	93	31	2	25	89
INTA RM 1177	2,55	2,49	0,15	0,27	0,70	0,24	112	95	11	1	2	77
CERRO CHENQUE 261	1,48	2,30	0,17	0,27	0,41	0,20	108	94	24	2	0	77
COY AIKE 292	1,59	2,37	0,20	0,26	1,74	0,49	111	95	78	2	3	78
INTA RM 1307	2,76	2,78	0,16	0,25	1,83	0,30	115	96	21	1	0	80

Tabla 8: Mejores 10 padres por orden de promedio de ojo de bife.

nombre	Diferencia Esperada en la Progenie						ind10	ind02	exa	NT	NC	con
	PCD	PC1	PVL1	PDF1	POB1	EGD1						
INTA RM 1981	3,20	4,09	0,26	0,48	1,86	0,30	118	89	10	1	2	61
INTA RM 1307	2,76	2,78	0,16	0,25	1,83	0,30	115	96	21	1	0	80
COY AIKE 292	1,59	2,37	0,20	0,26	1,74	0,49	111	95	78	2	3	78
LOS FLAMENCOS 791	0,46	3,16	0,14	0,21	1,65	0,27	104	95	46	1	0	70
COY AIKE 180	1,19	2,28	0,19	0,40	1,63	0,51	105	88	181	2	1	87
CALGA DOHNE 146954	3,36	3,59	0,22	-0,16	1,44	0,34	134	116	43	4	0	85
LOS FLAMENCOS 571	1,78	3,83	0,11	0,06	1,32	0,22	113	102	45	1	0	75
LAS VEGAS 303	0,04	1,56	-0,07	-0,38	1,31	-0,26	104	115	28	1	0	78
ROSEVILLE PARK 140055	2,04	1,91	0,19	-0,50	1,13	0,17	135	128	144	4	0	88
CERRO CHENQUE 251	1,48	1,50	0,04	-0,20	1,13	0,24	113	111	20	2	0	72

Tabla 9: Mejores 10 padres por orden de espesor de grasa dorsal.

nombre	Diferencia Esperada en la Progenie						ind10	ind02	exa	NT	NC	con
	PCD	PC1	PVL1	PDF1	POB1	EGD1						
COY AIKE 180	1,19	2,28	0,19	0,40	1,63	0,51	105	88	181	2	1	87
LAS VEGAS 225	1,58	1,92	0,15	-0,25	1,06	0,50	123	116	17	1	1	78
COY AIKE 292	1,59	2,37	0,20	0,26	1,74	0,49	111	95	78	2	3	78
RINCON MORROS 61	2,48	2,10	0,10	0,42	0,80	0,43	104	87	61	2	3	88
LAS VEGAS 317	0,73	0,42	0,02	-0,37	-0,27	0,42	112	117	13	1	1	75
INTA RM 1297	2,05	2,32	0,14	-0,07	0,96	0,39	119	108	24	1	7	81
COY AIKE 154	1,00	1,35	0,08	-0,18	0,93	0,35	113	111	76	2	0	90
LAS VEGAS 321	0,35	0,32	0,14	-0,36	-0,63	0,34	118	118	28	1	1	66
CALGA DOHNE 146954	3,36	3,59	0,22	-0,16	1,44	0,34	134	116	43	4	0	85
INTA RM 1307	2,76	2,78	0,16	0,25	1,83	0,30	115	96	21	1	0	80

Tabla 10: Mejores 10 padres por orden de índice de selección “Lanero”.

nombre	Diferencia Esperada en la Progenie						ind10	ind02	exa	NT	NC	con
	PCD	PC1	PVL1	PDF1	POB1	EGD1						
ROSEVILLE PARK 140055	2,04	1,91	0,19	-0,50	1,13	0,17	135	128	144	4	0	88
CALGA DOHNE 146954	3,36	3,59	0,22	-0,16	1,44	0,34	134	116	43	4	0	85
HAMILTON RUN 130004	0,92	0,86	0,12	-0,77	0,20	0,10	132	137	154	6	0	93
LOS FLAMENCOS 165	1,04	2,05	0,17	-0,37	0,76	0,20	125	121	33	1	1	85
LOS FLAMENCOS 153	0,10	0,55	0,15	-0,63	0,23	0,07	124	140	36	1	2	84
ROSEVILLE PARK 140464	2,73	2,72	0,14	-0,12	0,31	-0,03	124	112	88	4	3	89
HAMILTON RUN 150409	1,26	1,17	0,18	-0,28	0,26	0,05	123	117	51	1	8	82
LAS VEGAS 225	1,58	1,92	0,15	-0,25	1,06	0,50	123	116	17	1	1	78
FAR VALLEY 140055	3,12	3,60	0,03	-0,17	0,25	0,21	121	113	38	2	3	85
INTA RM 1993	1,41	2,52	0,23	-0,01	0,70	0,19	120	107	25	1	2	65

Tabla 11: Mejores 10 padres por orden índice de selección “Afinador”.

nombre	Diferencia Esperada en la Progenie						ind10	ind02	exa	NT	NC	con
	PCD	PC1	PVL1	PDF1	POB1	EGD1						
INTA RM 1833	1,39	1,48	0,19	0,55	0,38	0,10	101	82	10	1	3	72
RINCON MORROS 61	2,48	2,10	0,10	0,42	0,80	0,43	104	87	61	2	3	88
RINCON MORROS 91	2,75	2,50	0,11	0,43	0,62	0,13	106	88	65	1	1	83
COY AIKE 180	1,19	2,28	0,19	0,40	1,63	0,51	105	88	181	2	1	87
INTA RM 1981	3,20	4,09	0,26	0,48	1,86	0,30	118	89	10	1	2	61
COY AIKE 152	2,80	3,19	0,19	0,35	1,01	0,28	114	93	31	2	25	89
INTA RM 761	0,97	1,40	0,07	0,22	0,53	0,01	100	93	28	1	7	83
CERRO CHENQUE 261	1,48	2,30	0,17	0,27	0,41	0,20	108	94	24	2	0	77
LOS FLAMENCOS 791	0,46	3,16	0,14	0,21	1,65	0,27	104	95	46	1	0	70
INTA RM 1177	2,55	2,49	0,15	0,27	0,70	0,24	112	95	11	1	2	77

Tabla 12: Listado de padres Dohne Merino con progenies evaluadas para consumo residual (Solo eficientes)

nombre	rp_padre	fNacimiento	depCR
INTA RM 1201	INTA RM579	2017	-0,0791
INTA RM 1485	TRES ARBOLES132462	2019	-0,0603
CERRO CHENQUE 261	ROSEVILLE PARK140055	2020	-0,0571
UARDRY DOHNE 050068	SD SOUTH AFRICA010510	2005	-0,0234
INTA RM 389	TRES ARBOLES090705	2011	-0,0193
TRES ARBOLES 090669	ROSEVILLE PARK030376	2009	-0,0156
INTA RM 1177	INTA RM579	2017	-0,0155
INTA RM 509	TRES ARBOLES090705	2012	-0,0109
TRES ARBOLES 090705	MACQUARIE DOHNE041267	2009	-0,0097
INTA RM 1743	INTA RM1307	2020	-0,0040
TRES ARBOLES 080503	ROSEVILLE PARK050196	2008	-0,0026
INTA RM 503	RINCON MORROS61	2012	-0,0005
TRES ARBOLES 090711	MACQUARIE DOHNE041267	2009	0,0005

Tabla 13: Listado completo de padres Dohne Merino por orden alfabético

nombre	Diferencia Esperada en la Progenie						ind02	ind10	exa	NT	NC	con
	PCD	PC1	PVL1	PDF1	POB1	EGD1						
CALGA DOHNE 146954	3,36	3,59	0,22	-0,16	1,44	0,34	134	116	43	4	0	85
CEAT-INTA 39	0,90	0,89	0,08	-0,13	1,03	0,09	111	108	17	1	4	75
CERRO CHENQUE 251	1,48	1,50	0,04	-0,20	1,13	0,24	113	111	20	2	0	72
CERRO CHENQUE 261	1,48	2,30	0,17	0,27	0,41	0,20	108	94	24	2	0	77
CERRO CHENQUE 267	0,38	-0,51	0,02	-0,54	0,02	0,04	115	123	12	1	0	67
COY AIKE 150	1,25	1,70	0,11	-0,23	0,47	0,24	118	114	56	2	0	88
COY AIKE 152	2,80	3,19	0,19	0,35	1,01	0,28	114	93	31	2	25	89
COY AIKE 154	1,00	1,35	0,08	-0,18	0,93	0,35	113	111	76	2	0	90
COY AIKE 180	1,19	2,28	0,19	0,40	1,63	0,51	105	88	181	2	1	87
COY AIKE 184	0,86	1,37	0,10	0,00	0,96	0,22	108	103	16	2	0	82
COY AIKE 292	1,59	2,37	0,20	0,26	1,74	0,49	111	95	78	2	3	78
FAR VALLEY 140055	3,12	3,60	0,03	-0,17	0,25	0,21	121	113	38	2	3	85
FAR VALLEY 140359	1,65	1,28	0,07	-0,06	0,64	-0,02	112	106	43	3	7	86
FAR VALLEY 22-6785	3,07	2,87	0,11	-0,01	-0,03	0,00	120	107	40	1	0	41
HAMILTON RUN 130004	0,92	0,86	0,12	-0,77	0,20	0,10	132	137	154	6	0	93
HAMILTON RUN 150347	1,73	3,00	0,10	-0,22	0,26	-0,24	120	114	47	1	0	84
HAMILTON RUN 150409	1,26	1,17	0,18	-0,28	0,26	0,05	123	117	51	1	8	82
INDALO 177	-0,11	-0,22	-0,04	-0,23	-0,24	0,03	100	109	24	1	6	51
INTA RM 1021	1,36	1,16	0,11	-0,14	0,50	0,22	115	110	29	1	2	82
INTA RM 1153	0,32	-0,03	0,00	-0,28	0,71	-0,08	106	112	20	1	3	80
INTA RM 1177	2,55	2,49	0,15	0,27	0,70	0,24	112	95	11	1	2	77
INTA RM 1201	1,27	1,80	0,00	0,11	0,61	0,19	101	97	37	1	2	83
INTA RM 1203	1,53	0,63	0,03	-0,18	0,45	0,11	112	110	13	1	3	67
INTA RM 1297	2,05	2,32	0,14	-0,07	0,96	0,39	119	108	24	1	7	81
INTA RM 1307	2,76	2,78	0,16	0,25	1,83	0,30	115	96	21	1	0	80
INTA RM 1483	0,94	0,82	-0,03	-0,08	-0,40	0,13	102	104	14	1	2	76
INTA RM 1485	1,25	1,33	0,04	-0,02	0,61	-0,01	107	103	14	1	4	78
INTA RM 1653	0,95	0,86	0,09	-0,26	-0,39	0,07	115	114	11	2	3	71
INTA RM 1817	-0,18	0,27	0,06	-0,48	0,69	0,16	114	121	45	1	3	79

Provino Avanzado Dohne Merino – Catálogo Padres

	Diferencia Esperada en la Progenie											
nombre	PCD	PC1	PVL1	PDF1	POB1	EGD1	ind02	ind10	exa	NT	NC	con
INTA RM 1825	1,56	1,82	0,08	-0,08	0,26	-0,08	113	107	63	1	1	79
INTA RM 1833	1,39	1,48	0,19	0,55	0,38	0,10	101	82	10	1	3	72
INTA RM 1981	3,20	4,09	0,26	0,48	1,86	0,30	118	89	10	1	2	61
INTA RM 1993	1,41	2,52	0,23	-0,01	0,70	0,19	120	107	25	1	2	65
INTA RM 395	0,38	0,26	0,03	-0,01	-0,89	0,02	100	101	22	1	2	80
INTA RM 487	1,58	1,43	0,05	0,15	0,60	0,21	104	97	11	1	5	78
INTA RM 493	0,33	0,66	0,04	-0,05	-0,38	0,08	103	103	14	2	4	78
INTA RM 575	-0,86	-1,08	0,00	-0,42	-0,48	-0,01	104	116	57	2	1	87
INTA RM 579	1,12	1,70	0,09	-0,02	0,39	0,16	109	104	128	3	1	91
INTA RM 747	0,16	0,50	0,00	-0,29	-0,16	0,24	106	113	87	3	2	89
INTA RM 761	0,97	1,40	0,07	0,22	0,53	0,01	100	93	28	1	7	83
INTA RM 821	1,59	2,11	0,07	0,14	0,10	0,18	106	98	28	1	4	84
INTA RM 903	1,80	2,98	0,06	-0,09	0,23	0,26	113	108	34	2	6	84
INTA RM 967	1,15	0,74	0,14	-0,22	-0,48	0,17	118	114	25	1	2	82
INTA RM 969	1,06	0,01	0,04	-0,40	-0,30	-0,02	116	119	43	1	2	84
JL SOUTH AFRICA 160440	0,19	0,48	-0,01	-0,20	-0,16	0,00	103	108	14	1	0	70
LAS VEGAS 129	0,49	-0,94	0,08	-0,08	-0,22	0,16	106	105	31	1	1	82
LAS VEGAS 205	0,79	1,24	0,00	0,01	0,53	0,19	101	101	11	3	0	76
LAS VEGAS 225	1,58	1,92	0,15	-0,25	1,06	0,50	123	116	17	1	1	78
LAS VEGAS 303	0,04	1,56	-0,07	-0,38	1,31	-0,26	104	115	28	1	0	78
LAS VEGAS 313	2,08	2,76	0,04	-0,21	0,08	0,13	117	113	18	1	1	75
LAS VEGAS 317	0,73	0,42	0,02	-0,37	-0,27	0,42	112	117	13	1	1	75
LAS VEGAS 321	0,35	0,32	0,14	-0,36	-0,63	0,34	118	118	28	1	1	66
LAS VEGAS 493	1,76	1,30	0,06	0,04	0,06	0,18	108	102	10	1	2	69
LOS FLAMENCOS 153	0,10	0,55	0,15	-0,63	0,23	0,07	124	140	36	1	2	84
LOS FLAMENCOS 155	0,92	1,91	0,10	-0,37	0,44	0,10	120	119	34	1	1	84
LOS FLAMENCOS 165	1,04	2,05	0,17	-0,37	0,76	0,20	125	121	33	1	1	85
LOS FLAMENCOS 295	0,40	1,90	0,19	0,08	0,76	0,19	110	101	15	1	5	79
LOS FLAMENCOS 351	0,83	1,80	-0,01	0,00	0,29	0,08	101	101	29	1	0	83
LOS FLAMENCOS 361	-0,51	-0,17	-0,05	-0,32	-0,42	-0,02	100	112	62	2	0	87
LOS FLAMENCOS 413	-0,20	0,60	0,09	-0,01	0,08	0,01	102	101	30	1	0	82
LOS FLAMENCOS 495	0,20	2,06	0,08	-0,34	0,55	0,12	114	116	30	1	0	81
LOS FLAMENCOS 571	1,78	3,83	0,11	0,06	1,32	0,22	113	102	45	1	0	75
LOS FLAMENCOS 791	0,46	3,16	0,14	0,21	1,65	0,27	104	95	46	1	0	70
MALENA DOHNE 050298	0,33	0,59	0,03	-0,10	0,56	0,14	104	105	21	1	0	77
POTROK AIKE 251	0,35	-0,24	-0,06	-0,77	-0,74	-0,04	117	132	11	1	1	67
RINCON MORROS 103	-0,62	0,95	0,09	-0,18	0,22	0,20	105	108	14	1	5	75
RINCON MORROS 31	0,51	-0,29	0,02	-0,04	-0,12	0,13	101	102	91	2	3	88
RINCON MORROS 39	0,19	0,71	0,11	-0,05	0,21	0,07	107	104	36	1	1	81
RINCON MORROS 61	2,48	2,10	0,10	0,42	0,80	0,43	104	87	61	2	3	88
RINCON MORROS 87	0,92	1,47	0,07	0,12	0,22	0,19	103	97	52	1	1	78
RINCON MORROS 91	2,75	2,50	0,11	0,43	0,62	0,13	106	88	65	1	1	83
ROSEVILLE PARK 140055	2,04	1,91	0,19	-0,50	1,13	0,17	135	128	144	4	0	88
ROSEVILLE PARK 140464	2,73	2,72	0,14	-0,12	0,31	-0,03	124	112	88	4	3	89
SD SOUTH AFRICA 150015	0,92	1,65	0,10	0,13	0,23	0,04	105	98	37	1	0	78
TRES ARBOLES 030085	0,48	0,02	0,04	-0,02	-0,72	0,07	102	102	25	1	3	78

nombre	Diferencia Esperada en la Progenie						ind02	ind10	exa	NT	NC	con
	PCD	PC1	PVL1	PDF1	POB1	EGD1						
TRES ARBOLES 080503	-0,36	-0,35	0,02	-0,17	-0,51	0,09	101	107	28	1	1	80
TRES ARBOLES 090669	0,88	0,19	0,11	-0,06	-0,38	-0,02	110	106	20	1	2	80
TRES ARBOLES 090711	1,61	1,81	0,07	0,20	0,83	0,18	104	95	28	1	1	81
TRES ARBOLES 132409	0,44	0,81	0,01	-0,37	0,15	0,06	111	117	26	1	0	62
TRES ARBOLES 132486	0,31	0,25	0,05	0,02	-0,28	0,02	101	100	17	1	0	63
UARDRY DOHNE 010269	0,14	0,67	0,14	0,04	0,03	0,04	106	101	12	1	0	70
UARDRY DOHNE 050068	1,15	2,52	0,16	0,12	0,68	0,16	111	100	57	3	0	89
UARDRY DOHNE 090366	-0,49	-0,41	0,03	-0,36	0,31	0,07	106	115	62	5	0	88

Percentiles

En una evaluación genética poblacional como lo es ProOvino Avanzado se obtiene el mérito genético de los animales participantes en forma de dep's. Los dep's se encuentran dentro de un rango de valores, propio de la característica evaluada. Este rango es útil, como una primera aproximación, para precisar la posición de un determinado animal (en términos de porcentaje) respecto al resto de animales de la población. En la tabla, se presentan los porcentajes de animales (carneros, ovejas, borregas y borregos) por encima o por debajo de determinados valores de dep, también conocidos como **Percentiles**, para todas las características evaluadas.

A modo de ejemplo, cuando un usuario de ProOvino Avanzado busca un carnero más lanero, elegirá uno con dep positivo para Peso de Vellón. Con la ayuda de la tabla puede ser más preciso. Ahora, no sólo podrá seleccionar un carnero con dep positivo, sino que se ubique por ejemplo, dentro del 5% más positivo de la población. Por el contrario, si desea seleccionar carneros que afinen, se deberá tener mayor precaución ya que los animales mejor valorados serán los más negativos, ubicados al otro extremo de la tabla. De este modo, para cada característica, se pueden buscar animales extremos o moderados en su valoración genética.

Percentil	DEPPCD	DEPPC1	DEPPVL1	DEPPDF1	DEPPOB1	DEPEGD1	I10	I02
0%	2,71	4,11	0,27	-0,68	2,60	3,65	130	147
1%	2,13	3,26	0,22	-0,59	1,67	0,49	127	133
5%	1,70	2,30	0,16	-0,41	1,24	0,36	120	123
10%	1,41	1,76	0,13	-0,32	1,03	0,29	117	118
20%	0,94	1,26	0,09	-0,22	0,52	0,20	111	112
30%	0,63	0,83	0,07	-0,14	0,23	0,13	107	108
40%	0,42	0,55	0,04	-0,09	0,09	0,07	104	104
50%	0,33	0,44	0,03	-0,06	0,00	0,04	102	101
60%	0,14	0,26	0,01	-0,03	-0,07	0,03	99	99
70%	0,00	0,22	0,00	0,04	-0,11	0,00	96	96
80%	-0,14	-0,10	-0,01	0,12	-0,23	0,00	94	94
90%	-0,74	-0,52	-0,05	0,21	-0,32	-0,02	89	88
95%	-1,18	-0,93	-0,07	0,32	-0,47	-0,06	84	81
99%	-1,73	-1,75	-0,12	0,66	-0,86	-0,26	71	66
100%	-2,68	-2,96	-0,14	1,34	-1,37	-0,37	50	56